

수 학 영 역

(가 형)

성명	
----	--

수험번호						-				
------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- 자신이 선택한 유형(가형/나형)의 문제지인지 확인하십시오.
- 문제지의 해당란에 성명과 수험번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

그대의 꿈은 땀 속에서 조금씩 피어나는 꽃

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.

2021학년도 KUME(쿠메) 모의고사 1회

시행 : 2020년 9월 5일 (토) 오후 9시 55분 ~ 오후 11시 40분

집필 : 고려대학교 수학교육과 소모임 KUME(쿠메) 20

김민석 김정훈 김차민 김현민 박민용 방민서 배동현 백진희 서현덕 우현석 정상원 조동현 조영빈
최제현 황재민

손해설 : 이현기

검토 : 양우석

본 모의평가에 대한 저작권은 고려대학교 수학교육과 소모임 KUME(쿠메)에게 있으며
저작권자의 허락 없이 전부 또는 일부를 영리적 목적으로 사용하거나 2차적 저작물 작성 등으로 이용하는
일체의 행위는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호, 저작권 관련 법률에 따라 금지되어 있습니다.
KUME(쿠메) 모의고사에 관한 문의사항은 'KUME 모의고사' 페이스북 페이지 또는 bang8999@naver.com으로
문의바랍니다.

제 2 교시

수학 영역(가형)

5지선다형

1. $4^{\log_2 3} \times \sqrt[3]{16}$ 의 값은? [2점]

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \times 3^n + 3^{-n}}{3^n}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 두 학생 A, B에게 서로 다른 색의 구슬 5개를 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 하나의 구슬도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [2점]

- ① 32 ② 64 ③ 128 ④ 256 ⑤ 512

4. 첫째항이 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{13} = 8$ 일 때, $(a_9)^2 - (a_5)^2$ 의 값은? [3점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

2

수학 영역(가형)

5. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - 2n + 1}{n}\right) = 5$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n - 5}{n}$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$ 의 값은? [3점]

- ① $1 - \frac{\pi}{4}$ ② $1 - \frac{\pi}{5}$ ③ $1 - \frac{\pi}{6}$
 ④ $1 - \frac{\pi}{7}$ ⑤ $1 - \frac{\pi}{8}$

6. 양수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 점

$A(2, \log_2 a), B(5, \log_4 4b)$ 가 있다. 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표가 $(a, 1)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

8. 함수 $f(x)=2^x-5$ 가 닫힌구간 $[1, k]$ 에서 최댓값 3을 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (단, $k > 1$) [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

9. 함수 $f(x)=\frac{4e^x}{e^x+e^{-x}}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

10. 어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포가 다음 표와 같다.

X	-3	6	9	합계
$P(X=x)$	$\frac{5}{9}$	a	b	1

이 모집단에서 임의추출한 크기가 50인 표본의 표본평균 \bar{X} 에 대하여 $E(\bar{X})=2$ 일 때, $\sigma(\bar{X})$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

11. 연속함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \sin^2 x + \int_0^{\pi} f(t) \sin t dt$$

를 만족시킬 때, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5}{12}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{7}{12}$ ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{3}{4}$

12. 한 개의 동전을 반복하여 던질 때, 같은 면이 연속하여 나올 때마다 1점씩 얻기로 한다. 예를 들어 동전을 5번 던져서 차례로 '앞면, 앞면, 앞면, 뒷면, 뒷면'이 나오면 3점을 얻는다. 동전을 5번 던질 때, 2점을 얻을 확률은? [3점]

- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$ ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{7}{16}$


13. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & (\sin x \geq \cos x) \\ \cos x & (\sin x < \cos x) \end{cases}$$

에 대하여 방정식 $2\{f(x)\}^2 = \sqrt{3}f(x)$ 의 모든 해의 합은? [3점]

- ① 4π ② $\frac{9}{2}\pi$ ③ 5π ④ $\frac{11}{2}\pi$ ⑤ 6π

14. 그림과 같이 곡선 $y = \frac{\sqrt{x-2}}{x-1}$ 와 x 축 및 직선 $x=5$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [4점]



- ① $2\ln 2 - \frac{4}{5}$ ② $2\ln 2 - \frac{3}{4}$ ③ $2\ln 2 - \frac{2}{3}$
 ④ $\ln 3 - \frac{3}{4}$ ⑤ $\ln 3 - \frac{2}{3}$

6

수학 영역(가형)

15. 다음은 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(1 - \frac{2}{2^3-1}\right)\left(1 - \frac{3}{3^3-1}\right)\cdots\left\{1 - \frac{n-1}{(n-1)^3-1}\right\} < \frac{3n+4}{4n+4} \quad \dots\dots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=3$ 일 때, (좌변) = $\frac{5}{7}$, (우변) = $\frac{13}{16}$ 이므로

(*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ ($m \geq 3$) 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\left(1 - \frac{2}{2^3-1}\right)\left(1 - \frac{3}{3^3-1}\right)\cdots\left\{1 - \frac{m-1}{(m-1)^3-1}\right\} < \frac{3m+4}{4m+4}$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\left(1 - \frac{2}{2^3-1}\right)\left(1 - \frac{3}{3^3-1}\right)\cdots\left(1 - \frac{m}{m^3-1}\right)$$

$$< \left(\frac{3m+4}{4m+4}\right)\left(1 - \frac{m}{m^3-1}\right)$$

$$= \left\{\frac{3}{4} + \frac{1}{4(m+1)}\right\}\left(1 - \frac{m}{m^3-1}\right)$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{\boxed{\text{(가)}}}{4(m+1)(m^3-1)} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편 $m^2+3m+3 > 0$, $m+5 > 0$ 이므로

$$\frac{\boxed{\text{(가)}}}{(m+1)(m^3-1)}$$

$$< \frac{\boxed{\text{(가)}} + m^2 + 3m + 3}{(m+1)(m^3-1)} = \frac{m-2}{\boxed{\text{(나)}}$$

$$< \frac{m-2}{\boxed{\text{(나)}} - (m+5)} = \frac{1}{m+2} \text{에서}$$

$$\textcircled{1} < \frac{3}{4} + \frac{1}{4(m+2)} = \frac{3(m+1)+4}{4(m+1)+4} \text{이다.}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(1 - \frac{2}{2^3-1}\right)\left(1 - \frac{3}{3^3-1}\right)\cdots\left\{1 - \frac{n-1}{(n-1)^3-1}\right\} < \frac{3n+4}{4n+4}$$

이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $f(4)+g(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

16. 양수 a 에 대하여 곡선 $y = \frac{4x^2}{x^2+a^2}$ 의 서로 다른 두

변곡점을 각각 A, B라 하자. 이 곡선 위의 두 점 A, B에서의 접선이 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 가 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은? [4점]

- ① 3 ② $\frac{9}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 9

17. 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 5^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, 5^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$$f(21)=g(45), P(X \geq 23)+P(Y \leq 46) \geq 1$$

일 때, $P(20 \leq X \leq 25)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?


z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.2	0.0793
0.4	0.1554
0.6	0.2257
0.8	0.2881

[4점]

- ① 0.2347 ② 0.3050
- ③ 0.3811 ④ 0.4435
- ⑤ 0.5138

18. 좌표평면에서 두 곡선 $y = |\log_{\frac{1}{2}} x|$ 와 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 이 만나는 두 점을 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2$)라 하고, 두 곡선 $y = |\log_{\frac{1}{2}} x|$ 와 $y = 3^x$ 이 만나는 점을 $R(x_3, y_3)$ 이라 하자.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]




<보 기>

- ㄱ. $x_2 < y_3$
- ㄴ. $x_3 - x_2 > y_2 - y_3$
- ㄷ. $(x_1 - y_3)(y_2 - x_1) > (x_1 - x_3)(x_2 - x_1)$


- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 주머니 A에는 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어있다. 주머니 A에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 주머니 B에 넣고 주머니 B에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 공 중 1의 숫자가 적혀 있는 공의 개수와 2의 숫자가 적혀 있는 공의 개수가 각각 2 이하일 확률은? [4점]



- ① $\frac{13}{18}$
- ② $\frac{7}{9}$
- ③ $\frac{5}{6}$
- ④ $\frac{8}{9}$
- ⑤ $\frac{17}{18}$

20. 그림과 같이 $\overline{OA_1}=4$, $\overline{OC_1}=8$ 인 직사각형 $OA_1B_1C_1$ 이 있다. 선분 OC_1 위에 $\overline{A_1D}=\overline{C_1D}$ 가 되도록 점 D를 잡고, 중심이 D인 부채꼴 DA_1C_1 을 그린다. 부채꼴 DA_1C_1 이 선분 A_1B_1 과 만나는 점 중 점 B_1 과 가까운 점을 E, 선분 A_1C_1 과 선분 DE가 만나는 점을 F라 할 때 삼각형 C_1FE 에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자.
 그림 R_1 에서 점 O, 선분 OA_1 위의 점 A_2 , 선분 A_1D 위의 점 B_2 , 선분 OD 위의 점 C_2 를 꼭짓점으로 하고 $\overline{OA_2} : \overline{OC_2}=1 : 2$ 인 직사각형 $OA_2B_2C_2$ 를 그린다. 직사각형 $OA_2B_2C_2$ 에 그림 R_1 을 얻는 것과 같은 방법으로 삼각형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자.
 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [4점]



- ① $\frac{40}{7}$
- ② $\frac{165}{28}$
- ③ $\frac{85}{14}$
- ④ $\frac{175}{28}$
- ⑤ $\frac{45}{7}$

21. $a_5 = 2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_n| \geq \frac{3}{2}$ 이다.
 (나) 3 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $(S_n)^3 - (S_{n-1})^3 = (a_n)^3 + 9a_n$ 이다.

$\sum_{k=1}^{20} (a_k)^2$ 의 최솟값은? [4점]

- ① $\frac{153}{2}$ ② $\frac{155}{2}$ ③ $\frac{157}{2}$ ④ $\frac{159}{2}$ ⑤ $\frac{161}{2}$

단답형

22. $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\tan^2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ 의 값을 구하시오. [3점]

23. $\left(2x + \frac{1}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x 의 계수를 구하시오. [3점]

24. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(80, \frac{1}{4}\right)$ 을 따를 때, $V(2X+3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

25. 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시간 t ($0 \leq t < \pi$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = \sin t - 4\cos t, \quad y = 2\sin t + 2\cos t$$

이다. 점 P 의 속력이 최대일 때, 점 P 가 직선 $y = ax$ 위에 있다. a 의 값을 구하시오. [3점]


26. 반지름의 길이가 9인 원에 내접하고 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{9}$ 을 만족시키는 예각삼각형 ABC 가 있다.

$$\overline{BP} + \overline{CP} = 6, \quad \angle BPC = \frac{\pi}{3}$$

를 만족하는 점 P 에 대하여 삼각형 BPC 의 넓이는 k 이다. k^2 의 값을 구하시오. [4점]

27. 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8장의 카드가 들어있는 주머니에서 갑이 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸다. 갑이 꺼낸 두 장의 카드 중 3의 배수가 적힌 카드가 있으면 을은 카드를 꺼내지 않고, 3의 배수가 적힌 카드가 없으면 을이 이 주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸다. 갑 또는 을이 3의 배수가 적힌 카드를 꺼냈을 때, 갑이 3의 배수가 적힌 카드를 꺼냈을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이고, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않는다.) [4점]

28. 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB 가 있다. $\angle POB = \theta$ 를 만족시키는 호 AB 위의 점 P 에 대하여 선분 AB 가 선분 OP 와 만나는 점을 Q , 점 Q 에서 선분 AP 와 선분 BP 에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2 라 하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{H_1 H_2}{\theta} = a$ 일 때, $40a^2$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [4점]



29. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. [4점]

$$f(1) + f(2) + f(3) \leq 4 + f(4)$$

30. 상수 k 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = ke^{f(x)} + \int_0^x e^{f(t)} dt$$

라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 α 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 이다. $\int_{\alpha_2}^{\alpha_3} f(x) dx = 4$ 일 때, 두 함수

$f(x)$, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(\alpha_1) + f(\alpha_2) = f(\alpha_3) + f(\alpha_4)$$

(나) 함수 $(g \circ f)(x)$ 가 $x = \beta$ 에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 β 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 이다.

$\int_{\alpha_1}^{\alpha_4} \frac{f(x)g'(x)}{e^{f(x)}} dx = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.